

AMÉRIQUE DU NORD 2013 - EX 1


Aspirine et prévention cardiovasculaire (8,5 pts)

L'une des propriétés pharmacologiques de l'aspirine est d'être un fluidifiant du sang. C'est pourquoi l'aspirine peut être utilisée de manière préventive pour diminuer le risque de formation de caillots sanguins responsables des accidents vasculaires cérébraux (AVC). L'aspirine est alors prescrite à faible dose : 75 à 150 mg/jour.

Données :


• Anhydride éthanóïque (ou acétique)

- Masse molaire : 102 g·mol⁻¹
- Masse volumique : $\mu = 1,082$ kg·L⁻¹
- Liquide incolore d'odeur piquante
- Température d'ébullition sous pression normale : 136,4°C
- Soluble dans l'eau et l'éthanol




• Acide salicylique

- Masse molaire : 138 g·mol⁻¹
- Solide blanc
- Température de fusion 159°C
- Peu soluble dans l'eau à froid, soluble à chaud.
- Très soluble dans l'alcool et l'éther.



• Aspirine


- Masse molaire : 180 g·mol⁻¹
- Solide blanc, se décompose à la chaleur à partir de 128 °C
- Solubilité dans l'eau : 3,3 g·L⁻¹ à 25°C
- Très soluble dans l'éthanol



Les parties 1, 2, 3, 4 de l'exercice sont indépendantes.

1. Synthèse de l'aspirine


L'aspirine peut être synthétisée à partir d'acide salicylique et d'anhydride éthanóïque. L'équation de la réaction est :



La chromatographie sur couche mince (CCM) est l'une des techniques qui permet de contrôler la réaction chimique.

Protocole :

- Préparer un bain marie à la température de 70 °C ;
- Dans un erlenmeyer bien sec, sous hotte, introduire :
 - 10,0 g d'acide salicylique ;
 - 14,0 mL d'anhydride éthanóïque ;
 - quelques grains de pierre ponce.
- Réaliser un premier prélèvement du milieu réactionnel en vue d'une analyse sur CCM ;
- Adapter un réfrigérant à air sur l'erlenmeyer ;
- À $t = 0$, placer l'erlenmeyer dans le bain-marie ;
- Laisser réagir pendant une vingtaine de minutes tout en réalisant quatre nouveaux prélèvements du milieu réactionnel toutes les quatre minutes.



Obtention de l'aspirine :

- 1.1.1. Montrer que l'anhydride éthanóïque est introduit en excès.
- 1.1.2. Calculer la masse attendue d'aspirine lors de cette synthèse.

Suivi par chromatographie :

1.2.1. Proposer un protocole expérimental pour réaliser les différentes chromatographies afin, notamment, de s'assurer de la formation de l'aspirine. La liste du matériel et des produits disponibles est proposée dans le document 1 ci-dessous.

Document 1 : matériel disponible pour effectuer la chromatographie

Plaques pour CCM – capillaires – éluant – cuve à chromatographie – aspirine pur du commerce dissous dans un solvant – acide salicylique pur dissous dans un solvant – lampe UV ou solution de permanganate de potassium.


1.2.2. Quelles particularités doit présenter le chromatogramme obtenu avec le dernier prélèvement, en admettant que le système réactionnel est alors dans son état final ?

2. Analyse spectrale des espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l'aspirine

Spectre RMN de la molécule d'aspirine

2.1.1. Recopier la formule de la molécule d'aspirine et identifier les deux groupes caractéristiques dans cette molécule. Les nommer.


2.1.2. Deux carbone particuliers sont repérés par les lettres « a » et « b » dans la formule de la molécule d'aspirine reproduite ci-dessous :



Expliquer pourquoi les atomes d'hydrogène liés au carbone « a » correspondent au singulet du spectre RMN de la molécule d'aspirine reproduit dans le document 2 ci-après.

Justifier de même que le doublet de ce spectre RMN correspond à l'atome d'hydrogène lié au carbone « b ».

Document 2 : spectre RMN de la molécule d'aspirine





Spectre IR de la molécule d'acide éthanóïque

L'autre produit issu de la synthèse de l'aspirine est l'acide éthanóïque de formule brute C₂H₄O₂.

2.2.1. Donner la formule semi-développée de l'acide éthanóïque et du méthanoate de méthyle qui est un isomère de l'acide éthanóïque.

2.2.2. Les spectres infrarouges de ces deux espèces chimiques sont regroupés dans le document 3 ci-dessous. Une table de données de spectroscopie infrarouge est également fournie (document 4). Identifier celui qui appartient à l'acide éthanóïque en justifiant.

Document 3 : spectres IR de l'acide éthanóïque et du méthanoate de méthyle

Document 4 : table de données pour la spectroscopie IR

Famille	Liaison	Nombres d'onde (cm ⁻¹)
cétone	C = O	1705 - 1725
aldéhyde	C _{tri} - H	2700 - 2900
	C = O	1720 - 1740
acide carboxylique	O - H	2500 - 3200
	C = O	1740 - 1800
ester	C = O	1730 - 1750
alcool	O - H _{lié}	3200 - 3450
	O - H _{libre}	3600 - 3700

3. Dosage d'un sachet d'aspirine

L'étiquette d'un sachet d'aspirine prescrit au titre de la prévention des AVC porte la mention : « Teneur en aspirine : 100 mg »

Un élève se propose de vérifier la teneur en aspirine, notée HA, de ce sachet.

Pour cela, il prépare une solution S en introduisant l'aspirine contenue dans le sachet dans une fiole jaugée, puis en ajoutant de l'eau distillée pour obtenir une solution de volume 500,0 mL.

Il prélève ensuite un volume $V_A = (100,0 \pm 0,1)$ mL de cette solution S qu'il dose avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$) de concentration molaire $c_B = (1,00 \pm 0,02) \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ en présence de phénolphaléine. Le volume V_E de solution aqueuse d'hydroxyde de sodium versé pour atteindre l'équivalence est $V_E = 10,7 \pm 0,1$ mL.

3.1. Écrire l'équation de la réaction acido-basique support de ce dosage.

3.2. Déterminer la masse m_{exp} d'aspirine ainsi déterminée.

3.3. Déterminer l'incertitude relative $\frac{\Delta m_{\text{exp}}}{m_{\text{exp}}}$ dont on admet que, dans

les conditions de l'expérience, la valeur est donnée par la relation :

$$\left(\frac{\Delta m_{\text{exp}}}{m_{\text{exp}}} \right)^2 = \left(\frac{\Delta V_E}{V_E} \right)^2 + \left(\frac{\Delta c_B}{c_B} \right)^2$$

En déduire un encadrement de la masse m_{exp} obtenue par l'élève.

3.4. L'encadrement obtenu à la question précédente est-il en accord avec la mention portée sur le sachet d'aspirine ? Proposer une explication à l'écart éventuellement observé.

4. Autre forme de l'aspirine, moins agressive pour l'estomac

L'aspirine ou (acide acétylsalicylique) possède une base conjuguée, l'ion acétylsalicylate. Le $\text{p}K_a$ du couple acide/base ainsi constitué est égal à 3,5.

4.1. Lors de la digestion, le pH de l'estomac est voisin de 2. Quelle est la forme prédominante du couple aspirine/ion acétylsalicylate dans l'estomac ? Justifier.

Quand l'aspirine reste trop longtemps sous cette forme prédominante dans l'estomac, elle y provoque des lésions gastriques. C'est pourquoi on trouve dans le commerce des formulations différentes, moins agressives pour la paroi de l'estomac, comme la catalgine.

Catalgine (acétylsalicylate de sodium) :

- Le médicament est soluble dans l'eau et l'ingestion est facilitée.
- Dans l'estomac, dont le pH est très acide, les ions acétylsalicylate réagissent avec les ions H_3O^+ pour redonner de l'aspirine moléculaire qui précipite. Ce précipité, obtenu sous forme de grains microscopiques, est plus facilement assimilable.

4.2.1. Écrire la formule semi-développée de l'ion acétylsalicylate.

4.2.2. Expliquer pourquoi la catalgine est soluble dans l'eau.

4.2.3. Donner l'équation de la réaction se produisant dans l'estomac après ingestion de la catalgine.

Correction

1. Synthèse de l'aspirine

1.1.1. Quantité de matière d'anhydride éthanoïque : $n = m/M = \rho \cdot V/M = 149 \text{ mmol}$.

Quantité de matière d'acide salicylique : $n = m/M = 72,5 \text{ mmol}$.

D'après l'équation-bilan de la réaction, on voit qu'une mole d'anhydride éthanoïque réagit avec une mole d'acide salicylique. Donc l'anhydride éthanoïque est bien en excès car $n_{\text{anhydride éthanoïque}} > n_{\text{acide salicylique}}$.

1.1.2. La quantité de matière maximale d'aspirine que l'on peut obtenir est de 72,5 mmol, soit $m = 13,0 \text{ g}$

1.2.1. Protocole :

- Pour chaque prélèvement, réaliser un dépôt sur une plaque pour CCM à l'aide d'un capillaire à côté d'un dépôt témoin d'aspirine et, éventuellement, d'un dépôt témoin d'acide salicylique.


- Une fois tous les prélèvements effectués, mettre les plaques dans une cuve à chromatographie contenant un peu d'éluant et attendre que l'éluant arrive à environ 1 cm du bord supérieur de la plaque.

- Procéder à une révélation (par lampe UV ou avec la solution de permanganate de potassium) pour pouvoir observer les taches formées.

1.2.2. Le chromatogramme final ne doit pas présenter de tache correspondant à l'acide salicylique car la réaction est totale (simple flèche).

2. Analyse spectrale des espèces chimiques intervenant dans la synthèse de l'aspirine


2.1.1. Groupes caractéristiques de la molécule d'aspirine



2.1.2. Les hydrogène du carbone « a » ne possèdent aucun voisin, ils produisent donc un singulet.

L'hydrogène porté par le carbone « b » ne possède qu'un seul voisin. il produira donc un doublet.

2.2.1. Acide éthanoïque et méthanoate de méthyle



2.2.2. Un acide carboxylique présente une bande d'absorption à 2500 - 3200 cm^{-1} due à la liaison O-H. Celle-ci est nettement visible sur le spectre n°1, qui correspond donc à celui de l'acide éthanoïque.

3. Dosage d'un sachet d'aspirine

3.1. $\text{AH} + \text{HO}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$

3.2. Dans le volume V_A de solution d'aspirine, on a une quantité de matière $n_A = c_B \cdot V_E = 0,107 \text{ mmol}$. Donc le sachet contenait une quantité de matière 5 fois plus grande : $n = 0,535 \text{ mmol}$ et donc une masse $m = n \cdot M = 0,535 \cdot 10^{-3} \times 180 = 96,3 \text{ mg}$.

3.3. Incertitude relative :

$$\frac{\Delta m_{\text{exp}}}{m_{\text{exp}}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta V_E}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{\Delta c_B}{c_B}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0,1}{10,7}\right)^2 + \left(\frac{0,02}{1}\right)^2} = 0,022$$

D'où $\Delta m_{\text{exp}} = 2,2 \text{ mg}$, soit $m_{\text{exp}} = (96 \pm 2) \text{ mg} : 94 \text{ mg} < m_{\text{exp}} > 96 \text{ mg}$

3.4. Cet encadrement n'est pas en accord avec la valeur annoncée.

Plusieurs sources d'erreurs possibles :

- Toute l'aspirine solide du sachet n'a pas été dosée (il en est resté sur les parois du sachet et/ou elle ne s'est pas entièrement dissoute dans la solution ;

- Mauvaise lecture du volume de 500,0 mL sur la fiole jaugée ;

- Mauvaise détermination du volume équivalent V_E (changement de coloration difficile à repérer, mauvaise lecture sur la burette) ;


- erreur dans le prélèvement du volume V_A à doser.

- ou alors le fabricant fait de petites économie

4. Autre forme de l'aspirine, moins agressive pour l'estomac

4.1. $\text{pH} < \text{p}K_a$ donc l'aspirine est sous forme acide

4.2.1 Formule semi-développée de l'ion acétylsalicylate :



4.2.2. La catalgine est une espèce chargée, donc plus susceptible d'être soluble dans l'eau que l'aspirine

4.2.3. Réaction de la catalgine dans l'estomac

